鳥類和蟬：四季變化的信使

灰面鵟鷹 **學名：** *Butastur indicus* **(方言名：** Taka)

灰面鵟鷹屬於猛禽，每年從十月初開始遷徙至此。牠們身長約 50 公分，翼展超過 1 公尺，從春季到夏季在本州島繁殖，然後飛到氣候較溫暖的東南亞過冬。慶良間群島是灰面鵟鷹遷徙途中的中繼站，不過一些鳥兒會選擇在此過冬。當牠們在天空中發出「pi-kwee」的叫聲時，就代表慶良間群島進入秋季了。過去，灰面鵟鷹深受島上孩子們的喜愛，被親切地稱為「chin-mii」（日語中這種鳥類叫聲的擬聲詞）。

琉球赤翡翠（學名：*Halcyon coromanda*；方言名：**Kokaru**）

琉球赤翡翠在四月左右遷徙到慶良間群島繁殖後代。在早晨和傍晚，經常能在森林密布的幽谷中聽到牠獨特的「kyorororo-kyorororo」鳴叫聲，其聲音高亢，帶有下降的嘍鳴。牠們的體長僅 30 公分，讓鮮紅色的鳥喙更顯得巨大，身體上半部分為紅棕色，背部羽毛呈有光澤的深紫色，下半則是橘色。當森林裡迴盪著琉球赤翡翠的鳴叫聲時，表示雨季即將來臨。

琉球油蟬 **學名：** *Graptopsaltria bimaculata*

這種蟬大約從六月開始鳴叫，「jirijirijiri」的叫聲越頻繁，表示越接近雨季尾聲。琉球油蟬是琉球群島特有物種，從奄美群島到沖繩本島及附近地區均有分布，長約 5 公分，翅膀呈亮棕色，只要有人靠近就會停止鳴叫，因此很難發現牠們的蹤影。

黑巖寒蟬 **學名：** *Meimuna kuroiwae*

當黑巖寒蟬在靠近海邊的低窪處發出「jiiwa-jiiwa」鳴叫聲時，秋天就快到了。從鹿兒島縣佐多岬一直到沖繩本島皆可見到這種牠們，身長約 3.5 公分，與其他蟬相比顯得較纖細。翅膀透明，黑巖寒蟬背部有獨特的深色交雜黃綠色圖案。即使有人靠近，牠們通常也會留在原處繼續鳴叫，因此可以近距離觀察。

熊蟬 學名：Cryptotympana facialis

日本熊蟬嘹亮的「shaa-shaa」鳴叫聲，宣告雨季的結束。六月中旬的早上，在當地社區和附近區域通常都能聽到牠們的叫聲。原本出沒於日本西部較溫暖的地區（近畿、中國四國和九州）和以南地區，現在日本熊蟬的棲息地正在向北移動，並涵蓋關東地區。牠們身長 6 至 7 公分，體型在日本蟬類之中僅次於八重山熊蟬，翅膀是透明的，身軀呈黑色且富有光澤。由於日本熊蟬在有人靠近時不會飛走，因此是最容易近距離觀察和研究的蟬之一。